

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ



Фазы развития / Вредный объект	-	00	01 - 08	09 - 11	12	13	16	17 / 32 - 34	53	63	69	79 - 89
	До посева	Посев	До всходов	Всходы	2-й лист	3-5-й лист	6-8-й лист	9-й лист - трубкование	Трубкование до 9-го узла	Выбрасывание метелки	Цветение	Налив - полная спелость
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пузырчатая головня, фузариозные прикорневые и корневые гнили, фузариоз и плесневение початков										ПРИВЕНТ (0,5 кг/га)		
Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек				ЦИПИ (0,15-0,32 л/га), КУНГФУ СУПЕР (0,1-0,15 л/га)								
Хлопковая совка				АЛЬФА-ЦИПИ (0,3 л/га)								
Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и двудольные, злостные многолетние сорняки	ЗЕРО (2-8 л/га)											
Однолетние двудольные и злаковые растения	ПРОМЕТРИН (2-3,5 л/га)											
Однолетние двудольные и злаковые растения		ТЕРРАГАРД (3-4 л/га)										
Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные растения						ВОЯЖ (0,05-0,1 кг/га)						
Однолетние и многолетние двудольные растения (включая виды осота, бодяка) сорные растения						ДЕВИЗ (0,4-0,8 л/га)						
						АРАБЕСК (0,3-0,5 л/га)						