


# СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА



ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ

| Фазы развития / Вредный объект  | -                             | 00    | 05                          | 10  | 12                       | 14                           | 15-16                 | 30-39        | 51-69                | 71-79                      | 81-89   |  |
|---|-------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---|--|
|   | До посева                     | Посев | Прорастание (до всходов)    | Семядоли  | 1 пара настоящих листьев | 4-5 настоящих листьев        | 6-8 настоящих листьев | Рост в длину | Бутонизация-цветение | Формирование и налив семян | Побурение корзинок, созревание  |  |
|   | 0                             | 1     | 2                           | 3   | 4                        | 5                            | 6                     | 7            | 8                    | 9                          | 10  |  |
| Однолетние злаковые и двудольные растения, Многолетние злаковые и двудольные, Злостные многолетние растения | <b>ЗЕРО</b> (2-8 л/га)        |       |                             |   |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
| Однолетние двудольные и злаковые растения   | <b>ПРОМЕТРИН</b> (2-3,5 л/га) |       |                             |   |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
|   | <b>КОБРА</b> (3-6 л/га)       |       |                             |   |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
| Однолетние двудольные и злаковые растения   |                               |       | <b>ПИРАНЬЯ</b> (0,8-1 л/га) |   |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
|   |                               |       | <b>ТЕРРАГАРД</b> (3-4 л/га) |   |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
| Однолетние и многолетние двудольные сорные растения   |                               |       |                             |   |                          | <b>КОРРИДА</b> (25-50 гр/га) |                       |              |                      |                            |   |  |
| Однолетние злаковые и двудольные растения   |                               |       |                             |   |                          | <b>ПАРСЕК</b> (1,0-1,5 л/га) |                       |              |                      |                            |   |  |
| Фомопсис (серая пятнистость стеблей, рак стеблей); белая гниль  |                               |       |                             |   | <b>АЯКС</b> (0,7 л/га)   |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
| Однолетние и многолетние злаковые растения  |                               |       |                             | <b>ХАНТЕР</b> (1-3 л/га), <b>ЛАНКАСТЕР</b> (0,2-1,0 л/га) |                          |                              |                       |              |                      |                            |   |  |
| Десикация   |                               |       |                             |   |                          |                              |                       |              |                      |                            | <b>ТЕСЛО</b> (1,5-2,0 л/га), <b>ГОТ-ЛАНД</b> (0,7-1,8 л/га), (0,7-1,8(A)) |  |